

## Angiologie / Hämostaseologie

- Arterielle Verschlusskrankheit
- Aneurysma-Erkrankungen
- Gefäßentzündungen
- Thrombosen
- M. Raynaud
- Krampfadern
- Besenreiser
- Lipödem, Lymphödem, venöses Ödem
- Gerinnungsneigung (Thrombophilie)
- Blutungsneigung (Hämophilie)
- Abortneigung u.v.m.

## Endokrinologie / Osteologie

- Osteoporose
- Haarausfall
- Hirsutismus
- Insulinresistenz
- PCO-Syndrom
- Hypophyse
- Nebennieren
- Hypogonadismus
- Transsexualität u.v.m.

## Humangenetik

- Thrombophilie / Hämophilie
- Onkogenetik
- Endokrine Tumore
- Stoffwechselerkrankungen
- Unerfüllter Kinderwunsch u.v.m.

## Nuklearmedizin


- Schilddrüse
- Nebenschilddrüsen
- Herz
- Skelett
- Gehirn (Parkinson)
- Lunge
- Nieren
- Nebennieren
- Knochenmark u.v.m.

## Rheumatologie

- Rheumatoide Arthritis
- Spondylarthritis
- Psoriasisarthritis
- Lupus erythematoses
- Systemische Sklerose
- Dermato- und Polymyositis
- Polymyalgia rheumatica
- M. Wegener u.v.m.

Ludwigstr. 2-4 + Elisenstr. 32  
63739 Aschaffenburg  
Fon 06021-447798-0  
Fax 06021-447798-44  
mail@mvzab.de

## Online Termine & Befundabruf



Mit Bahn oder Pkw nur 30 min. von Frankfurt



# VERÖDUNG VON BESENREISERN

## Sklerotherapie von Besenreisern

Die Sklerosierung von Besenreisern und kleinen Krampfadern erfolgt ambulant. Sie wird mit besonders feinen Nadeln sowie Polidocanol als Verödungsmedikament durchgeführt. Die Behandlung dauert etwa 10-20 Minuten.

### Ablauf

Bei der Behandlung wird das flüssige Sklerosierungsmittel mit einer sehr feinen Nadel in die betroffenen Gefäße injiziert. Dies führt zum kompletten Verschluss und Verschwinden der Vene.

Bei etwas größeren Krampfadern wird der Wirkstoff Polidocanol aufgeschäumt und mit einer feinen Nadel in die Vene gespritzt.

Hier finden Sie einen Film zu Ablauf und Wirkprinzip der Sklerotherapie.



Besenreiser veröden mit der Mikro-Sklerotherapie

## Nach der Verödungstherapie

Im Anschluss an die Sklerosierung sind Sie voll belastbar und arbeitsfähig. Sie sollten jedoch für 2 Tage keinen anstrengenden Sport treiben sowie Sauna und Wannenbäder vermeiden.

Außerdem vermeiden Sie bitte 2 Wochen lang intensive Sonnenbestrahlung und Solarium, um das Auftreten von Braunverfärbungen (Hyperpigmentierung) im Bereich der behandelten Venen zu verhindern.

Falls Sie Beschwerden im behandelten Bein verspüren oder eine Schwellung des Beines auftreten sollte, muss umgehend durch uns oder Ihren Hausarzt eine Beinvenenthrombose ausgeschlossen werden.



Gestautes Blut im Besenreiser wird verdrängt

### Vorteile

- wirksam (Erfolg bei >95 % nach 3 Monaten)
- sicher
- schmerzarm
- keine Narben durch Hitze möglich (im Gegensatz zur Laserbehandlung)
- kostengünstig
- sehr gute Studienlage
- Therapie der Wahl nach Leitlinien



Vor der Mikro-Sklerotherapie von Besenreisern



Nach der Mikro-Sklerotherapie von Besenreisern